

SEZNAM Odstotkov vojne invalidnosti

I. poglavje - ROKA

A) Pest

a) Prsti

1.	Omejena gibljivost vseh prstov ene pesti:	
	a) lažje	20%
	b) težje	30 do 40%
2.	Omejena gibljivost večine prstov na roki, razen palca	20 do 40%
3.	Zatrditev palca v interfalangalnem sklepu v neugodnem položaju	20%
4.	Zatrditev palca v metakarpofalangalnem sklepu	20%
5.	Zatrditev palca v metakarpofalangalnem sklepu v neugodnem položaju	30%
6.	Zatrditev večine prstov roke, razen palca	30 do 40%
7.	Zatrditev vseh prstov roke	
	a) v ugodnem položaju	40 do 50%
	b) v neugodnem položaju	60 do 70%
8.	Amputacija palca - obe falangi	30%
9.	Amputacija obeh falang palca z metakarpalno kostjo	40%
10.	Amputacija kazalca	20%
11.	Amputacija dveh prstov brez metakarpalne kosti	20%
12.	Amputacija kazalca in sredinca	30%
13.	Amputacija dveh prstov z metakarpalnimi kostmi:	
	a) palca in kazalca	50%
	b) kazalca in sredinca	40%
	c) sredinca in prstanca	40%
	d) prstanca in mezinca	30%
14.	Amputacija treh ali več prstov z ohranjenimi metakarpalnimi kostmi:	
	a) palca in katerihkoli prstov (razen kazalca)	40%
	b) palca, kazalca in katerihkoli prstov	50%
	c) kazalca, sredinca in mezinca	40%
	d) zadnjih štirih prstov	50%
	e) palca in katerihkoli treh prstov	50%
15.	Amputacija vseh prstov ene roke	60%
16.	Amputacija obeh palcev in enega kazalca	60%
17.	Amputacija obeh palcev, enega kazalca in enega sredinca	70%
18.	Amputacija obeh palcev in treh drugih prstov, vendar ne vseh na isti roki	80%
19.	Amputacija treh prstov z metakarpalnimi kostmi:	
	a) palca, kazalca in sredinca	60%
	b) kazalca, sredinca in mezinca	50%
	c) sredinca, prstanca in mezinca	40%
20.	Delna amputacije enega palčevega členka in dveh kazalčevih členkov	20%
21.	Delna amputacija enega palčevega členka in dveh kazalčevih členkov z malo gibljivimi krni	30 do 40%
22.	Pri delni amputaciji več prstov se določi odstotek po dani shemi in sicer tako, da se seštejejo odstotki, ki ustrezajo izgubi vsakega prstnega členka; če je seštevek večji kot 15%, znaša odstotek invalidnosti 20%, itd., in sicer:	
	a) za en palčev členek	8%
	b) za en kazalčev členek	6%

- | | |
|---|-----------|
| c) za en členek drugih prstov | 4% |
| 23. Zlomi metakarpalnih kosti s funkcionalnimi motnjami ali težje deformacije ali izpah karpometakarpusa s funkcijsko okvaro, upoštevajoč okvaro pesti in posameznih prstov | 20 do 40% |

b) Zapestje

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 24. Omejena gibljivost pesti (hujša) | 20 do 30% |
| 25. Zatrditev zapestnega sklepa | |
| a) v ugodnem položaju | 30% |
| b) v neugodnem položaju | 40% |
| 26. Amputacija pesti | 70% |

B) Podlaket

- | | |
|---|-----------|
| 27. Napačno zaraščeni zlom z omejeno pronacijo in supinacijo | 20 do 30% |
| 28. Napačno zaraščeni zlomi s popolno nepregibnostjo pronacije in supinacije, položaj pesti pa ugoden v pronaciji ali v srednjem položaju | 40% |
| 29. Napačno zaraščeni zlomi s popolno negibnostjo pronacije in supinacije, položaj pesti pa v supinaciji | 50% |
| 30. Lažni sklep ene kosti | 20 do 30% |
| 31. Lažni sklep obeh kosti | 40% |
| 32. Amputacija podlakta | 70% |

C) Laket

- | | |
|---|-----------|
| 33. Gibljivost ohranjena med 105 st. do popolne fleksije | 40% |
| 34. Gibljivost ohranjena med 90 st. in 75 st. oziroma med 90 st. in 105 st. | 30% |
| 35. Gibljivost ohranjena med 75 st. in 0 st., roka v neugodnem položaju, v ekstenziji | 40 do 50% |
| 36. Nepregibnost v pravem kotu ali nekoliko manjšem (90 st. do 105 st.) | 30% |
| 37. Nepregibnost v ostrem kotu (manjšem kot 105 st.) | 40% |
| 38. Nepregibnost lakta v popolni fleksiji | 60% |
| 39. Nepregibnost v neugodnem iztegnjenem položaju (od 75 st. do 0 st.) | 50 do 60% |
| 40. Ohlapen sklep | 30 do 50% |
| 41. Amputacija roke v laktu (eksartikulacija) | 80% |

D) Nadlaket

- | | |
|---|-----|
| 42. Psevdoartroza nadlahtnice, brez možnosti za operativno korekcijo (potreben ortopedski aparat) | 60% |
| 43. Amputacija roke v nadlaktu | 90% |

E) Rama

- | | |
|--|------------------|
| 44. Omejena gibljivost rame težje stopnje (roke ni moč dvigniti več kot vodoravno) | 20 do 40% |
| 45. Popolna zatrditev ramena | 30 do 60% |
| 46. Ohlapen ramenski sklep (ni mogoče ozdravljenje) | 20 do 40% |
| 47. Eksartikulacija roke v ramenu | 100% II. skupina |

F) Okvare perifernega živčevja roke

48. Ohromelost brahialnega pleksusa	
a) lažje stopnje	20%
b) srednje stopnje	40 do 50%
c) težje stopnje	60 do 70%
d) popolna	80%
49. Paraliza n. axilarisa	30%
50. Pareza n. axilarisa	20%
51. Paraliza n. medianusa ali n. radialisa ali n. ulnarisa	40%
52. Pareza n. medianusa ali n. radialisa ali n. ulnarisa	20 do 30%
53. Paraliza n. musculocutaneusa	30%
54. Pareza n. musculocutaneusa	20%
55. Popolna ohromelost roke	90%
56. Prizadet n. akcesorius	20 do 30%
57. Sindrom karpalnega kanala	20%

II. poglavje - NOGA

A) Stopalo

58. Amputacija palca:	
a) brez metatarzalne kosti	20%
b) z metatarzalno kostjo	30%
59. Amputacija dveh ali treh prstov z metatarzalnimi kostmi, razen palca	30%
60. Amputacija vseh prstov na eni nogi	30%

B) Nart

61. Zlom ene ali več metatarzalnih kosti, če je posledica tega deformacija stopala in prstov in otežkoča hojo	20%
62. Amputacija stopala po Lisfrancku	30 do 40%

C) Podgleženj

63. Zlom ene ali več tarzalnih kosti, z deformacijo stopala	20 do 40%
64. Amputacija po Chopartu	40 do 50%

D) Skočni sklep

65. Omejena gibljivost stopala:	
a) težje stopnje	20%
b) v equinusu	20 do 30%
66. Omejena gibljivost stopala v calcaneus položaju	30%
67. Zatrđitev skočnega sklepa:	
a) v pravem kotu	20%
b) v neugodnem položaju, v kateremkoli drugem kotu	30 do 50%
68. Amputacija v skočnem sklepu po Pirogovu	50%
69. Eksartikulacija v skočnem sklepu	60%

E) Golen

- | | |
|--|-----------|
| 70. Dobro zaraščeni zlomi goleni brez atrofije mišic, z ohranjeno gibljivostjo sosednjih sklepov: | |
| a) s skrajšanjem do 3 cm | 20% |
| b) s skrajšanjem več kot 3 cm | 30% |
| 71. Slabo zaraščeni zlomi goleni (skrajšanje, zdaljšanje): | |
| a) do 3 cm | 30% |
| b) več kot 3 cm | 30 do 40% |
| 72. Slabo zaraščeni zlomi goleni z deformacijo, z deviacijo stopala, z atrofijo mišic, s stalno oteklino | 40 do 50% |
| 73. Lažni sklep goleni | 50% |
| 74. Amputacija v goleni | 70% |

F) Pogačica

- | | |
|---|-----------|
| 75. Lažni sklep pogačice, delna ali popolna patelektomija | 20 do 30% |
|---|-----------|

G) Koleno

- | | |
|---|-----------|
| 76. Omejena gibljivost kolena desmogenega ali artrogenega izvora, z možno ekstenzijo: | |
| a) od 30 st. do 10 st. | 20 do 40% |
| b) pod 30 st. | 40 do 50% |
| 77. Artroplastika ali umeten kolenski sklep | 40 do 50% |
| 78. Zatrditev kolena v ugodnem položaju, iztegnjenem ali skoraj iztegnjenem | 40% |
| 79. Zatrditev kolena v neugodnem položaju (v fleksiji od 30 st. do popolne fleksije) | 50 do 60% |
| 80. Ohlapen kolenski sklep | 20 do 40% |

H) Stegnenica

- | | |
|--|-----------|
| 81. Zlom stegenice s skrajšanjem do 3 cm, brez atrofije mišic in kontrakture sklepov | 20% |
| 82. Zlom stegenice (s skrajšanjem ali zdaljšanjem): | |
| a) od 3 cm do 6 cm | 20 do 40% |
| b) nad 6 cm | 50 do 60% |
| 83. Slabo zaraščen zlom stegnениčnega vratu | 40 do 60% |
| 84. Lažni sklep stegenice | 60% |
| 85. Lažni sklep stegnениčnega vratu | 60% |
| 86. Eksartikulacija v kolenu | 80% |
| 87. Amputacija v ravni stegna | 90% |

I) Kolk

- | | |
|---|------------------|
| 88. Omejena gibljivost kolka | |
| a) v ugodnem položaju | 20 do 40% |
| b) v neugodnem položaju (noga v fleksiji ali noga v abdukciji, notranji ali zunanji rotaciji) | 40 do 60% |
| 89. Umeten kolčni sklep | 40 do 60% |
| 90. Zatrditev kolka: | |
| a) v ugodnem položaju | 50% |
| b) v neugodnem položaju | 60 do 70% |
| 91. Eksartikulacija v kolku | 100% II. skupina |

J) Medenica

92. Konsolidiran zlom medeničnih kosti ter dislokacija simfize, z lažjimi in srednjehudimi težavami pri hoji, brez komplikacij na drugih organih v medenični votlini 20 do 40%

K) Okvare perifernega živčevja noge

93. Popolna ohromelost lumbosakralnega plexusa na eni strani s posledično ohromelostjo noge 80%
94. Paraliza ishiadikusa 60%
95. Pareza ishiadikusa 20 do 30%
96. Paraliza n. peroneusa 40%
97. Pareza n. peroneusa 20 do 30%
98. Paraliza n. tibialisa 40%
99. Pareza n. tibialisa 20 do 30%
100. Paraliza n. femoralisa 40 do 50%
101. Pareza n. femoralisa 20 do 30%
102. Paraliza zg. in sp. glutealnega živca 30%
103. Parestetična meralgija 20%

L) Ožilje

104. Aneurizme manjših arterij pesti ali stopala, ene arterije, podlakta ali goleni, itd. 20%
105. Aneurizme obeh arterij pesti ali stopala 20 do 40%
106. Aneurizme obeh arterij podlakta ali goleni 30 do 50%
107. Aneurizme art. femoralis ali art. popliteae 40 do 60%
108. Aneurizme art. axilaris ali art. Brachialis 50 do 70%
109. Aneurizme art. carotis:
- a) zunanje 50%
 - b) notranje 70 do 80%
110. Aneurizme pomembnih in za kirurške posege težje dostopnih arterij 40 do 90%
111. Zapore (okluzivne) bolezni arterij (po Dopplerju) 30 do 80%
112. Krčne žile na nogi, težje stopnje 20 do 30%
113. Krčne žile na nogi z razjedami in otekljami 30 do 50%
114. Tromboflebitis in potrombotični sindrom:
- a) obsežni tromboflebitis ali globoka venska tromboza po poškodbi ali po operativnem poteku (začasno od 1 do 2 let) 30 do 60%
 - b) potrombozni sindrom z elefantiazo kot posledico venske tromboze 30 do 50%
115. Limfedem z elefantiazo 30 do 50%

III. poglavje - GLAVA

A) Lobanja in možgani

1. Poškodbe lobanje in okvare centralnega živčnega sistema

116. Zlom lobanjskega svoda z udrtjem brez okvare možgan ali možganskih živcev (s posledičnimi zapleti) 20 do 30%

117. Zlom lobanjskega dna (baze) brez okvare možgan ali možganskih živcev (s posledičnimi zapletmi) 30 do 40%
118. Težka poškodba glave:
 a) Postkomocijski sindrom 20 do 40%
 b) s frakturom lobanje ali brez nje s težko prizadetostjo možgan in posledično demenco 80 do 100% II. skupina
119. Dekortizacija, decerebracija 100% I. skupina
120. Psihoorganski sindrom po cranio – cerebralni travmi:
 a) lažje stopnje 20 do 30%
 b) srednje stopnje 30 do 60%
 c) težje stopnje 70 do 90%
 d) Apalični sindrom 90 do 100% I. skupina
121. Epilepsija kot posledica možganske poškodbe ali njenih komplikacij:
 a) če so napadi redki 20 do 30%
 b) če so napadi 1x-3x mesečno 40 do 60%
 c) če so napadi 1x- 3x tedensko 60 do 80%
 d) če so napadi dnevno ali večkrat dnevno 80 do 100% II. skupina
 e) če spremljajo epileptične napade, ne glede na pogostnost, trajne psihične spremembe pacienta, zaradi njegovih osebnostnih motenj, inteligenčnih motenj oziroma metalnega upada 40 do 60%
 f) v najhujših primerih 100% I. skupina
122. Monopareza
 a) lažje stopnje 30 do 40%
 b) težje stopnje 50 do 60%
123. Monoplegija 60 do 80%
124. Hemipareza:
 a) lažje stopnje 30 do 40%
 b) srednje stopnje 40 do 50%
 c) težje stopnje z očitno spasticiteto 60 do 70%
125. Hemiplegija 80 do 100% I. skupina
126. Govorne motnje:
 a) dizartrija 20 do 40%
 b) disfazija 20 do 50%
 c) afazija 50 do 60%
 d) afazija z aleksijo, agrafijo 70 do 90%
 e) afazija z aleksijo, agrafijo in izraženimi hudimi psihičnimi motnjami 70 do 100% II. skupina
127. Agnozija, apraksija
 a) lažje stopnje 20 do 30%
 b) težje stopnje 40 do 50%
128. Hemianopsija (homonima, bitemporalna) 30%
129. Bolečinski (Talamični sindrom po poškodbi):
 a) lažje stopnje 30 do 50%
 b) srednje stopnje 60 do 80%
 c) težje stopnje 90 do 100% II. skupine
130. Ekstrapiramidni sindrom, Parkinsonizem, cerebralni ataktični sindrom po poškodbi:
 a) lažje stopnje 20 do 30%
 b) srednje stopnje 40 do 60%
 c) težje stopnje 70 do 100% II. skupina
 d) najtežje stopnje (zaradi ataksije gibanje ni mogoče) 100% I. skupina
131. Cerebelarni sindrom:
 a) lažje stopnje 20 do 30%
 b) srednje stopnje 40 do 60%

- c) težje stopnje (nesposobnost samostojnega gibanja) 70 do 100% I. skupina
132. Pseudobulbarni sindrom:
- a) lažje stopnje 30 do 40%
 - b) srednje stopnje 50 do 60%
 - c) težje stopnje 70 do 80%
133. Vegetativne motnje kot posledice prizadetosti avtonomnega živčevja:
- a) lažje stopnje 20%
 - b) srednje stopnje 40 do 50%
 - c) težje stopnje 60 do 80%

2. Možgansko deblo in možganski živci

134. Ohromelost bulbarnih živcev
- a) v manjšem obsegu 30 do 50%
 - b) v večjem obsegu 60 do 80%
135. Bulbarna paraliza 80 do 100% II. skupina
136. Okvara olfaktoriusa 20%
137. Okvara abducensa ali trochlearisa 30%
138. Okvara okulomotoriusa 40%
139. Pareza bulbomotorjev z diplopijami 50%
140. Ptoza veke (glede na ostrino vida in vidnega polja):
- a) delna 20 do 30%
 - b) popolna 40%
141. Atrofija optikusa (glede na stopnjo okvare vida):
- a) nepopolna 30 do 40%
 - b) popolna 50%
142. Okvara facialisa:
- a) pareza 30%
 - b) paraliza 50%
143. Okvara vestibularisa (nekompenzirana):
- a) lažje stopnje 20%
 - b) srednje stopnje 30 do 40%
 - c) težje stopnje 50 do 60%
144. Okvara trigeminusa:
- a) okvara oftalmikusa z nevroparalitičnim keratitisom in okvaro vida 30 do 50%
 - b) okvara motorične veje za žvekalne mišice 30 do 40%
 - c) trigeminus nevralgija:
 - težje stopnje 30 do 40%
 - težje stopnje z vsakodnevnimi napadi 50 do 70%
 - najtežje stopnje (brezuspješno zdravljenje) 70 do 100% II. skupina
145. Nevralgija glosofaringikusa ali n. rekurensa 20%
146. Okvara n.vagusa (n. frenikusa), motnje požiranja, vegetativne motnje, ipd. 30 do 40%

B) Čeljust

147. Zlom čeljustnice in ličnice:
- a) zlom zgornje čeljustnice z defektom ali s posledično nepravilno okluzijo 20 do 50%
 - b) zlom ličnice (otežena gibljivost) 20 do 40%
 - c) kompliciran zlom ličnice s posledično diplopijo 20 do 40%
148. Slabo zaraščen zlom spodnje čeljustnice s prizadeto artikulacijo preostalih zob 30 do 50%
149. Stanje po zlomu spodnje čeljustnice z omejenim odpiranjem ust

- | | |
|--|-----------|
| a) lažje stopnje | 20% |
| b) težje stopnje | 30 do 50% |
| 150. Psevdoartroza spodnje čeljusti z okvaro čeljustne kosti in zob: | |
| a) lažje stopnje | 30 do 50% |
| b) težje stopnje | 60 do 80% |

C) Oči

- | | |
|--|-----------|
| 151. Izguba očesa, popolna izguba vida na enem očesu ali izredno zmanjšanje vida (ostrina vida je manjša od 0,05) | 50% |
| Če je vid na enem očesu izgubljen, na drugem pa zmanjšan, se odstotek 50% poveča za vsakih 0,20 zmanjšane vida za 10%. Enako se ocenjuje tudi zmanjšanje vida na obeh očeh (na primer VOD je 0,80, VOS je 0,60). Skupni odstotek znaša 30% pri zmanjšanju vida za 0,20 na desnem očesu in za 0,40 na levem očesu. Zmanjšanje vida se ocenjuje s korekcijo. | |
| 152. Bitemporalna hemianopsija, kvadrantne binazalne in gornje horizontalne hemianopsije | 30% |
| 153. Večji trajni defekti v vidnem polju na obeh očeh, mišljeni absolutni paracentralni skotom, katerega najmanjši premer je več kot 30 st. | 30% |
| 154. Lagoftalmus očesa | 20 do 30% |
| 155. Stalno solzenje kot posledica poškodbe solzovoda | 20% |

D) Nos

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 156. Izguba nosu | |
| a) delna | 20 do 50% |
| b) popolna | 60% |
| 157. Deformacija nosne piramide | 20 do 30% |

E) Usta in zobje

- | | |
|---|-----------|
| 158. Poškodbe neba in jezika (oteženo požiranje in govorjenje): | |
| a) lažje stopnje | 30% |
| b) srednje stopnje | 40 do 50% |
| c) težje stopnje | 60 do 80% |
| 159. Izguba jezika ali njegova popolna paraliza | 90% |
| 160. Delna paraliza jezika in neba (težave pri govoru in požiranju) | 40 do 60% |
| 161. Izguba skoraj vseh zob: | |
| a) protetična rehabilitacija je možna | 30% |
| b) protetična rehabilitacija je delno možna | 40% |
| c) protetična rehabilitacija ni možna | 50% |

F) Uho in sluh

- | | |
|---|-----|
| 162. Izguba sluha na enem ušesu | 30% |
| 163. Popolna izguba sluha na obeh ušesih | 70% |
| 164. Obojestranska hujša okvara sluha nad 90% po Fowlerju | 60% |
| 165. Obojestranska hujša naglušnost: | |
| a) skupna izguba sluha nad 70 do 90% po Fowlerju | 40% |
| b) skupna izguba sluha 60 do 70% po Fowlerju | 30% |
| 166. Izguba uhlja | 30% |

167. Hujša deformacija uhlja in zunanlega sluhovoda 20%

G) Skaženost - iznakaženost

168. Skaženost (ocenjena po teži skaženosti glave in vratu):

- a) lažje stopnje 20%
- b) srednje stopnje 30 do 40%
- c) težje stopnje 50 do 60%

IV. poglavje - HRBTENICA IN HRBTENJAČA

169. Frakture hrbteničnih vretenc brez živčnih motenj, vendar z omejeno gibljivostjo:

- a) z manjšimi deformacijami 20 do 30%
- b) z večjimi deformacijami 40 do 50%

170. Radikularna okvara:

- a) lažje stopnje 20 do 40%
- b) težje stopnje 50 do 60%

171. Mielopatija (po prizadetosti udov):

- a) lažje stopnje 60%
- b) srednje stopnje 70 do 80%
- c) težje stopnje 90 do 100 I. skupina

172. Hernia intervertebralnega diskusa po poškodbi s trajnimi okvarami živčnih korenov (vratnega, prsnega ali ledveno-križnega predela):

- a) lažje stopnje (lažje okvare motilitete in senzibilitete) 20 do 30%
- b) srednje stopnje 40 do 60%
- c) težje stopnje z izraženo okvaro motilitete, atrofijami in s trofičnimi motnjami iz določene radikularne regije 70 do 100% II. skupina

173. Parapareza:

- a) lažje stopnje 30 do 50%
- b) srednje stopnje 60 do 70%
- c) težje stopnje (hoja je možna s pripomočki) 80 do 100% II. skupina

174. Paraplegija (flakidna ali spastična - trajna negibnost) 80 do 100% I. skupina

175. Tetrapareza:

- a) lažje stopnje 20 do 40%
- b) srednje stopnje 50 do 70%
- c) težje stopnje 80 do 100% II. skupina

176. Tetraplegija:

- a) težje stopnje, z delno premičnostjo rok 80 do 100% II. skupina
- b) najtežje stopnje, bolnik je povsem nepremičen 100% I. skupina

177. Sindrom Kavde ekvine:

- a) lažje stopnje 30%
- b) srednje stopnje 40 do 50%
- c) težje stopnje 60 do 70%

178. Sfinkterske motnje, nevrogeni mehur, motnje potence:

- a) lažje stopnje 40%
- b) srednje stopnje 50 do 60%
- c) težje stopnje 70 do 80%

179. Zgodnja spondiloza, zgodnja intra-vertebralna hondroza in i.v. osteohondroza, spondilatroza in spondilartritis, spondiloliza, spondilolisteza (kot posledica poškodbe, vnetja, spremenjene mehanike hoje):

- a) s funkcijsko okvaro hrbtenice (bolečinski sindrom z omejeno gibljivostjo hrbtenice) 20 do 40%

- b) s funkcijsko okvaro hrbtenice in nevrološkimi izpadi 50 do 70%
- c) s težjimi funkcijskimi okvarami hrbtenice in nevrološkimi izpadi 80 do 100% II. skupina
- 180. Pri aktivni kostni in sklepni tuberkulozi med njeno evolucijo in bakterijskem in gljivičnem vnetju pri lokalizaciji na hrbtenici, sakroiliakalnih sklepih, kolkih in kolenih:
 - a) če invalid ni popolnoma nepremičen 60 do 100% II. skupina
 - b) če je invalid popolnoma nepremičen 100% I. skupina
- 181. Skrivljenost vratu kot posledica kakršnekoli poškodbe 20 do 40%
- 182. Polinevritisi, polinevropatije, poliradikulitisi
 - a) lažje stopnje, z diskretno okvaro motilitete 20 do 30%
 - b) srednje stopnje 40 do 60%
 - c) težje stopnje 70 do 80%
 - d) hude stopnje (hujša okvara motilitete, senzibilitete, trofike, hoja možna s pripomočki ali tudi ne) 90 do 100% II. skupine
 - e) najtežje stopnje (invalid nepremičen) 100% I. skupine

V. poglavje - PRIZADETOST CENTRALNEGA IN PERIFERNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA PRI DRUGIH BOLENJIH

- 183. Prizadetost centralnega in perifernega živčnega sistema pri vnetnih, avtoimunih, degenerativnih, metabolnih, endokrinih in drugih obolenjih (ocenjeno po prizadetosti nevroloških struktur):
 - a) lažje stopnje 20 do 40%
 - b) srednje stopnje 50 do 70%
 - c) težje stopnje 80 do 100% I. skupina
- 184. Mišice in nevromuskularni sistem
 - a) lažje stopnje 30 do 40%
 - b) srednje stopnje 50 do 70%
 - c) težje stopnje 80 do 100% II. skupina

VI. poglavje - GRLO IN SAPNIK

- 185. Zožitev grla, sapnika ali obeh (oteženo dihanje in govor):
 - a) lažje stopnje 20 do 40%
 - b) težje stopnje 50 do 80%
- 186. Poškodba grla ali sapnika (potrebna stalna traheostoma):
 - a) govor za sporazumevanje je še mogoč 80%
 - b) govor za sporazumevanje ni možen (stanje podobno kot po laringektomiji) 100% II. skupina
- 187. Tuberkuloza grla 50 do 100 II. skupina
- 188. Paraliza živcev grla (zgornjega, spodnjega ali obeh) 20 do 40%

VII. poglavje - ŽRELO IN POŽIRALNIK

- 189. Okvare žrela:
 - a) ohromelost žrela 20 do 50%
 - b) zožitev žrela z motnjami pri požiranju 30 do 60%
 - c) popolna zožitev žrela (požiranje ni mogoče) 100% II. skupina
- 190. Zožitev požiralnika:

- | | |
|--|------------------|
| a) lažje motnje pri požiranju | 20 do 40% |
| b) težje motnje pri požiranju (potrebno pogosto bužiranje) | 50 do 70% |
| 191. Povsem zaprt požiralnik (hranjenje po gastrostomi) | 100% II. skupina |

VIII. poglavje - PRSNI KOŠ

- | | |
|---|------------------------|
| 192. Slabo konsolidiran zlom reber in grodnice, z večjimi deformacijami prsnega koša: | |
| a) brez reperkusij, izraženih na srcu in pljučih | 20 do 40% |
| b) če hkrati obstaja respiratorna ali srčna insuficienca | 50 do 100% II. skupina |
| 193. Plevropulmonalna fistula kot posledica pitoraksa | 30 do 50% |
| 194. Obsežnejše plevralne zarastline ali fibroza pljuč kot posledica poškodb, bolezni plevre ali pljuč, deformacije prsnega koša, skrivljenosti hrbtenice z zmerno respiratorno insuficienco, vendar brez srčne insuficienca | 20 do 40% |
| 195. Obsežnejše plevralne zarastline ali fibroza pljuč kot posledica poškodb, bolezni plevre ali pljuč, precejšnje deformacije prsnega koša (fibrotoraks, plevralni kronični empijem, tujki v pljučih, kontuzije pljuč, uporaba umetne ventilacije), hujša skrivljenost hrbtenice z izrazito respiratorno insuficienco (dispneja, cijanoza), s srčno insuficienco (kronično pljučno srce) ali z amiloidozo: | |
| a) srednje stopnje | 50 do 70% |
| b) težje stopnje | 80 do 100% II. skupina |
| 196. Okvara ščitnice s hormonalnimi motnjami in/ali prizadetimi obščitnicami: | |
| a) lažje stopnje | 20 do 30% |
| b) težje stopnje | 40 do 60% |
| 197. Okvara sapnika, bronhialnega vejevja (z oviranim dihanjem in stalno traheostomsko kanilo): | |
| a) srednje stopnje | 40 do 50% |
| b) težje stopnje | 60 do 80% |
| 198. Stanje po traheotomiji, okvara torakalne stene, diafragme, mediastinuma s požiralnikom (torakoplastika-mioplastika, disfagia-afagia, trajna gastrostoma): | |
| a) lažje stopnje | 20 do 30% |
| b) srednje stopnje | 40 do 60% |
| c) težje stopnje | 70 do 100% II. skupina |
| 199. Izguba dojke | 30% |
| 200. Inaktivna pljučna tuberkuloza srednjega in večjega obsega: | |
| a) brez respiratorne in kardiovaskularne insuficienca | 20 do 30% |
| b) z obliteriranimi plevralnimi sinusi | 30 do 50% |
| 201. Aktivna enostranska pljučna tuberkuloza ali tuberkuloza pljučne mreže z izlivom, pulmonalne ali plevralne fistule z empijom | 60 do 80% |
| 202. Obojestranska ali ekstenzivna enostranska aktivna (odprta ali zaprta) pljučna tuberkuloza, progresivna, vendar še vedno dostopna zdravljenju, in razne pulmonalne in plevralne fistule z empijom in večjo splošno telesno slabostjo | 80 do 100% II. skupina |
| 203. Progresivna razširjena aktivna obojestranska pljučna tuberkuloza z razvito kaheksijo in drugimi hudimi komplikacijami (respiratorna, kardiovaskularna in podobna | |

- | | |
|--|-----------------|
| insuficienca, amiloidoza itd.) | 100% I. skupina |
| 204. Stanje po operativnih intervencijah na prsnem košu zaradi pljučne tuberkuloze: | |
| a) ekscizija tuberkuloma in kazeoznih žarišč, resekciji 1-2 segmenta, gornja torakoplastika do 4 reber | 40 do 60% |
| b) lobektomija, torakoplastika 5 do 7 reber, kavernostomija | 50 do 70% |
| c) pulmektomija, torakoplastika 8 ali več reber | 60 do 80% |

IX. poglavje - SRCE

A) Kompenzirana srčna obolenja

- | | |
|--|-----------|
| 205. Prebolela revmatična mrzlica z znaki karditisa ali brez njih z ozirom na posledična stanja in brez: | |
| a) lažje stopnje | 20 do 30% |
| b) težje stopnje | 40 do 60% |
| 206. Organska obolenja srčnih zaklopk: | |
| a) brez znatnejšega povečanja srca in brez pojava srčne dekompenzacije | 30% |
| b) po stopnji povečanja srca in teži anatomske poškodbe srčnih zaklopk brez znakov subdekompenzacije oziroma dekompenzacije srca | 30 do 50% |
| 207. Okvare srčne mišice in perikarda (koronarne in druge) ali hude motnje v ritmu | 40 do 80% |

B) Dekompenzirana srčna obolenja z znaki zastoja v pljučih ali velikem krvnem obtoku

- | | |
|--|------------------------|
| 208. Srčna insuficienca: | |
| a) delno razvita (z zmerno razvitim pljučnim zastojem ali povečanjem jeter, ki jo je mogoče uspešno popraviti) | 60 do 80% |
| b) popolnoma razvita (ki jo je mogoče zadostno popraviti, izključuje pa vsak napor) | 80 do 100% II. skupina |
| c) v najhujših primerih | 100% I. skupina |

C) Kirurški posegi na srcu

- | | |
|---|------------------|
| 209. Operativna zamenjava valvul: | |
| a) zamenjava ene ali dveh valvulv sinusnem ritmu brez dekompenzacije srca | 30 do 60% |
| b) zamenjava ene ali dveh valvul z absolutno aritmijo komore z občasno dekompenzacijo | 80% |
| c) zamenjava vseh treh valvul | 100% II. skupina |
| d) s stalno srčno dekompenzacijo | 100% I. skupina |
| e) vstavljen srčni vzpodbujevalec | 60 do 80% |
| f) premostitvena operacija venčnih arterij (by pass) | 60 do 80% |

X. poglavje - TREBUH

- | | |
|--|-----------|
| 210. Kila po poškodbi ali operaciji trebuha zaradi poškodbe in po obremenitvah | 20 do 30% |
| 211. Pooperativno stanje z motnjami in težavami po resekciji | |

želodca po katerikoli metodi (ulkus pepticum jejuni, postprandialni sindrom, anemija):	
a) lažje stopnje	20 do 40%
b) težje stopnje	50 do 70%
212. Stanje po poškodbi črevesja s prešitjem ali resekcijo	20%
213. Motnje v pasaži črevesja zaradi poškodbe ali operacij po poškodbi, odvisno od izrazitosti stenotičnih sprememb:	
a) lažje stopnje	20 do 30%
b) težje stopnje	40 do 60%
214. Ulkusna bolezen želodca in dvanajsternika (glede na posledično stanje)	20 do 40%
215. Huda nedohranjenost in pooperativni malabsorpcijski sindrom	60 do 80%
216. Črevesne fistule tankega črevesa, odvisno od višine in nutrijskih problemov (glede na funkcijske motnje)	70 do 100% II. skupina
217. Sterkoralne fistule debelega črevesa	30 do 70%
218. Stalni anus preter naturalis (po kontinenci)	70 do 100% II. skupina
219. Analne fistule	20 do 40%
220. Inkontinenca (izguba analnega sfinktra s prolapsom ali brez ali zožitev analnega sfinktra):	
a) lažje stopnje	40 do 50%
b) srednje stopnje	60 do 70%
c) težje stopnje	80 do 100% II. skupina
221. Izguba vranice:	
a) brez sprememb na krvi	20%
b) s spremembami na krvi	30 do 50%
222. Stanje po poškodbi trebušne slinovke ali po prebolelem posttraumatskem tudi pooperativnem pankreatitisu	30 do 60%
223. Pankreatična fistula po poškodbi ali operaciji (glede na uspešnost zdravljenja)	50 do 80%
224. Stanje po traumatski poškodbi jeter	20 do 40%
225. Žolčne fistule po poškodbi žolčevodov ali jeter (glede na uspešnost zdravljenja)	30 do 80%
226. Hepatitis:	
a) akutni (glede na uspeh zdravljenja)	60%
b) kronični	30 do 60%
227. Ciroza (posthepatitična):	
a) lažje stopnje	60 do 70%
b) težje stopnje	80 do 100% II. skupine

XI. poglavje - UROPOETIČNI ORGANI

228. Stanje po akutnem glomerulonefritisu (glede na uspeh zdravljenja)	40 do 60%
229. Kronični glomerulonefritis z normalno ledvično funkcijo (proteinurija do 1 g in/ali eriturija in normalni krvni tlak)	20 do 30%
230. Kronični glomerulonefritis s proteinurijo več kot 1g, eriturijo, arterijsko hipertenzijo in normalno zmanjšano glomerularno filtracijo za manj kot 50%:	
a) lažje stopnje	30 do 50%
b) težje stopnje	60 do 80%
231. Kronični glomerulonefritis s proteinurijo več kot 1g, eriturijo, arterijsko hipertenzijo in zmanjšano glomerularno filtracijo za več kot 50%	80 do 100% II. skupina

232.	Končna odpoved ledvic, ki zahteva zdravljenje s hemodializo ali peritonealno dializo	90 do 100% I. skupine
233.	Izguba ene ledvice z normalno drugo	30%
234.	Izguba ene ledvice z okvarjeno drugo:	
	a) lažje stopnje	30 do 50%
	b) težje stopnje	60 do 100% II. skupina
235.	Aktivna tuberkuloza ledvice:	
	a) lažje stopnje	30 do 50%
	b) težje stopnje	60 do 80%
236.	Stanje po poškodbi sečnega mehurja:	
	a) kronični travmatski cistitis	20 do 40%
	b) v najhujših primerih, s stalno inkontinenco in s sfrknjenim mehurjem	50 do 80%
237.	Fistule sečevoda, sečnega mehurja ali sečnice, skozi katere teče seč (glede na uspeh zdravljenja)	40 do 80%
238.	Stalna inkontinenca seča zaradi poškodbe zunanjega sfinktra sečnice	50 do 80%
239.	Trajna zožitev sečnice z oteženim uriniranjem (zaradi spremembe izključno na sečnici)	50 do 80%

XII. poglavje - GENITALNI ORGANI

A) Moški

240.	Izguba enega moda pred 60. letom starosti	20%
241.	Izguba obeh mod:	
	a) pred 60. letom	70%
	b) po 60. letu	50%
242.	Izguba penisa:	
	a) pred 60. letom	80%
	b) po 60. letu	60%
243.	Izguba penisa in obeh mod:	
	a) pred 60. letom	100% II. skupina
	b) po 60. letu	80%
244.	Kronično vnetje obmodka z azoospermijo	20%
245.	Posttravmatska atrofija testisov	30%

B) Ženski

246.	Izguba enega jajčnika pred 50. letom starosti	20%
247.	Izguba obeh jajčnikov:	
	a) pred 50. letom	60%
	b) po 50. letu	30%
248.	Izguba maternice ali maternice in enega jajčnika:	
	a) pred 50. letom	60%
	b) po 50. letu	30%
249.	Izguba obeh jajčnikov in maternice:	
	a) pred 50. letom	80%
	b) po 50. letu	40%
250.	Poškodba vulve in vagine	20 do 50%

XIII. poglavje - DRUGE BOLEZNI

251. Sladkorna bolezen (diabetes mellitus):
- a) lažje stopnje (brez nedohranjenosti, brez glukozurije, ob ustrezni dieti) 20 do 30%
 - b) srednje stopnje, ki zahtevajo peroralno antidiabetično terapijo ali insulin, da bi se ohranilo ravnovesje v prehrani) 40 do 60%
 - c) težje stopnje, ki jih je tudi z velikimi dozami insulina težko urediti (z nedohranjenostjo in pogostimi pojavi acidoze ter komplikacijami na drugih organih) 70 do 100% I. skupina
252. Hipoadenokorticism (m. Addisoni):
- a) lažje stopnje 40 do 50%
 - b) težje stopnje 60 do 80%
253. Kronična malarija s trajnimi posledicami 20 do 40%
254. Zastrupitev, poškodba z bojnimi strupi in radiacijske okvare:
- a) lažje stopnje 30 do 40%
 - b) srednje stopnje 50 do 70%
 - c) težje stopnje 80 do 100% I. skupina
255. Kronični osteomielitis s pogostimi ponavljajočimi fistulami 20 do 40%
256. Amiloidozne okvare notranjih organov ali kaheksije:
- a) lažje stopnje 20 do 40%
 - b) srednje stopnje 50 do 70%
 - c) težje stopnje 80 do 100% I. skupina
257. Somatske bolezni:
- avtoimuna obolenja (Imunopatije, Multipla skleroza, Lupus eritematodes, Tireoideopatije, Limfocitni tireoiditis, Mb. Basedow, Miastenija, Nevrodermitis, Skleroderma, Psoriaza, Revmatoidni artritis, Mb. Bechterew, Mb. Behcet, Chronova bolezen, Ulcerozni kolitis, Holangitis, Kronični gastritis, Hašimoto bolezen, Mb. Sjögren, Vaskulitis, Arteriitis temporalis, ipd.)
 - infektivna stanja in infektivna obolenja (Nevrosarkoidoza, Nevroborelijoza, Meningitis, Meningoencefalitis, Encefalitis raznih oblik, Poliomieliitis, Mononukleoza, Botulizem, Toksoplazmoza, Listerioza, Hepatitis, malarija in druge podobne tropske bolezni, AIDS)
 - endokrine in metabolne bolezni (Tireoideopatije, Diabetes insipidus, Mb. Addison, Myelosis funicularis)
 - maligni neoplastični procesi
 - bolezni krvnih celic, kostnega mozga, limfatičnega sistema in druge motnje hemostaze:
- a) v lažjih primerih 20 do 40
 - b) v srednje težkih primerih 50 do 70
 - c) v težjih primerih 80 do 100 II. skupine

XIV. poglavje - NEVROZE IN PSIHOZE

258. Klinično ugotovljene nevrotične motnje:
- a) srednje stopnje 30 do 40%
 - b) težje stopnje (anksiozno depresivne, fobično depresivne, fiksirane konverzivne in druge nevrotske motnje) 50 do 60%
259. Klinično ugotovljene psihoze in psihična stanja:
- a-1) v blagi obliki (delazmožen) 20 do 40%
 - a-2) v težji obliki (delno delazmožen) 50 do 60%
 - a-3) v najtežji obliki (v razviti fazi bolezni) 70 do 90%
 - b) reaktivna psihična stanja (psihogena psihoza, reaktivna depresija, reaktivno konfuzno delirantna stanja, stanja po poskusih samomora, psihična

neprilagodljivost)	60 do 80%
260. Druge klinično ugotovljene psihične motnje:	
a) travmatske stresne motnje (posttravmatski sindrom)	30 do 50%
b) odvisnost od psihoaktivnih substanc	20 do 40%