

## PRILOGA 2

### MINIMALNI POGOJI ZA PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA

1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati partija semenskega krompirja kategorije predosnovno seme:

- prisotnost zemlje in tujih primesi ne sme presegati 1,0 utežnega %;
- masa gomoljev, ki jih je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, količinsko ne sme presegati 0,2 utežnega %;
- masa gomoljev z zunanjimi poškodbami, vključno z izmaličenimi ali poškodovanimi gomolji, ne sme presegati 3,0 utežnih %;
- masa gomoljev z navadno krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot tretjino površine gomolja, ne sme presegati 5,0 utežnih %;
- masa gomoljev, uvelih zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrolikost krompirja, ne sme presegati 0,5 utežnega %;
- masa gomoljev z znaki prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov ne sme presegati pragov, določenih za posamezni nadzorovani škodljivi organizem v preglednici 1 te priloge;
- skupna masa gomoljev iz druge do pete alineje te točke ne sme presegati 6,0 utežnih %.

Preglednica 1: Pragovi za prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v partijah semenskega krompirja kategorije predosnovno seme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali njegovi simptomi	Prag za prisotnost nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma ali njegovih simptomov
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al. [LIBEPS]	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0 %
Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0 %
Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0 %

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati partija semenskega krompirja kategorije osnovno seme ali certificirano seme:

- prisotnost zemlje in tujih primesi: največ 1,0 utežni % v kategoriji osnovno seme in največ 2,0 utežna % v kategoriji certificirano seme;
- masa gomoljev, ki jih je prizadela suha trohnoba ali mokra gniloba, razen če jo povzroča *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann etKotthoff) Davis et al. ali *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuchi et al.: največ 0,5 utežnega %, od tega največ 0,2 utežnega % mokre gnilobe;
- masa gomoljev z zunanjimi poškodbami, kot so npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji: največ 3,0 utežni %;
- masa gomoljev z navadno krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot tretjino površine gomolja: največ 5,0 utežnih %;
- masa gomoljev, uvelih zaradi izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrolikost krompirja: največ 1,0 utežni %;

- masa gomoljev z znaki prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov ne sme presegati pragov, določenih v preglednici 2 te priloge pri posameznem nadzorovanem škodljivem organizmu za kategorijo osnovno seme in kategorijo certificirano seme;
- skupna masa gomoljev iz druge do šeste alineje te točke ne sme presegati 6,0 utežnih % v kategoriji osnovno seme in 8,0 utežnih % v kategoriji certificirano seme.

Preglednica 2: Pragovi za prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v partijah semenskega krompirja kategorije osnovno seme in kategorije certificirano seme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali njegovi simptomi	Prag za prisotnost nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma ali njegovih simptomov
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0 %
Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	5,0 %
Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	3,0 %«