

PRILOGA 5

DODATNI POGOJI ZA PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA

1. Pri pregledu partije semenskega krompirja pred trženjem mora biti ugotovljeno, da so gomolji v partiji:

- praktično brez znamenj bolezni in škodljivcev in brez poškodb, ki bi lahko vplivale na njihovo kakovost kot semenskega krompirja, zlasti ne smejo biti poškodovani zaradi nizkih ali visokih temperatur,
- primerno osušeni in čisti,
- oblike, ki je značilna za sorto.

2. Dovoljena odstopanja od pogojev kakovosti iz prve in druge alineje prejšnje točke so za posamezno kategorijo in stopnjo navedena v preglednici iz te priloge.

Preglednica: Dovoljena odstopanja od pogojev kakovosti za partije semenskega krompirja

	Predosnovno seme		Osnovno seme	Certificirano seme
	IS-TC	IS	vse stopnje	vse stopnje
1. Poškodovani gomolji in gomolji z znamenji bolezni:				
1.1 gomolji, ki jih je prizadela gniloba (razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe), – od tega mokra gniloba	0 -	0,2 -	0,5 0,2	0,5 0,2
1.2 gomolji z navadno krastavostjo krompirja (z več kot 1/3 prizadete površine gomolja)	0	5,0	5,0	5,0
1.3 gomolji, uveli zaradi izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrolikost krompirja	0	0,5	1,0	1,0
1.4 gomolji z zunanjimi poškodbami (npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji)	0	3,0	3,0	3,0
1.5 gomolji s simptomi prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov:				
– <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al. [LIBEPS]	0	0	0	0
– <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0	0	0	0
– bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	0	1,0	5,0	5,0
– prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	0	1,0	3,0	3,0
Skupaj dovoljena odstopanja iz točke 1.1. do 1.5.	-	6,0	6,0	8,0
2. Prisotnost zemlje in tujih primesi	0,5	1,0	1,0	2,0